

MASTERSil®

MASTERSil®

MASTERSil®

CZ / MASTERSIL® CHLOR TABLET

Charakteristika: MASTERSil® Chlor Tablet jsou 200 g pomalu rozpustné tablety určené k průběžné péči o vodu v bazénu po celou sezónu. Postupné uvolňování chloru zabraňuje tvorbě bakterií a řas. Díky pomalému rozpouštění tablet není nutná každodenní péče. **Návod k použití:** Po prvním napuštění bazénu proveďte počáteční ošetření bazénové vody přípravky MASTERSil® Chlor START nebo ŠOK, stabilizujte hodnotu pH v rozmezí 7,0 – 7,4 pomocí přípravků MASTERSil® pH plus nebo minus. Poté je možné přejít na pravidelnou údržbu vody pomocí tablet. **Dávkování:** Při teplotě vody nepřesahující +25°C dávkuje 1 – 2 tablety na 25 m³ vody každých 5 – 7 dní. V případě vyšší teploty bazénové vody doporučujeme zvýšit dávkování (tablety se budou rychleji rozpouštět) dle potřeby. Pro dosažení hygienicky nezávadné a průzračné čisté vody je nutné udržovat obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3 – 0,5 mg/l a hodnotu pH v rozmezí 7,0 – 7,4. Průběžně tyto hodnoty kontrolujte, zejména po delší odstavce bazénu. V případě, že hodnota chloru je vyšší než 0,5 mg/l, bazén nepoužívejte a vyčkejte samovolného snížení obsahu chloru. Tablety vložte do plováku nebo do skimmeru při zapnutém filtračním zařízení, nikdy nevhazujte samostatné tablety do bazénu. **Vhodné pro neprofesionální použití.** Dodávatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním s přípravkem. Nevypouštějte vodu ošetřenou tímto přípravkem do přírodních vodních zdrojů a toků, vypouštění do kanalizace konzultujte s jejím správcem. **Spotřebujte do data uvedené na obale.** **Skladování:** Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchu a chladu, v dobře větrných místech, mimo zdroje tepla a otevřeného ohně, odděleně od hořlavých látek a kyselin, oxidačních materiálů, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. V letním období neskladujte přípravek po delší dobu na nevetraném místě. Neskladujte při teplotě nad 25°C. Skladování při vyšší teplotě může vést k rychlému rozkladu, vývinu chlorového plynu a tepla dostačujícího k zapálení hořlavých materiálů. **Typ přípravku:** PT2. **Obsah účinné látky:** Kyselina trichlorisokyanurová (Symklozen) CAS 87-90-1 900 g/kg. **Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Údaje pro dekontaminaci:** V případě rozsypaní tablety smetete, zabráňte prašnosti, případně důkladně odsajte a umístěte do vhodné nádoby na odpad. Po spotřebování přípravku obal opakovaně nepoužívejte. **První pomoc:** Při vdechnutí: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při styku s kůží: Omyjte postižené místo velkým množstvím vody. Při zasažení očí: Ihned vyplachujte proudem tekoucí vody, rozvězte oční víčka, pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Při požití: Nevypouštějte zvracení, vypláchněte ústa vodou. Zajistěte lékařské ošetření. **Standardní věty o nebezpečnosti:** H272 Může zesílit požár; oxidant. H402 Zdraví škodlivý při požití. H319 Spůsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. **Nebezpečná látka:** Kyselina trichlorisokyanurová. **Pokyny pro bezpečné zacházení:** P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování prachu. P270 Při používání tohoto výrobku nejzte, nepijte ani nekuřte. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P312 Nečistěte-li se dobře, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech. EUH 206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

NEBEZPEČÍ / NEBEZPEČENSTVO



CHLOR TABLET



**týdenní chlorové tablety
pro celosezónní údržbu bazénové vody**

SPOLEHLIVĚ NIČÍ BAKTERIE A ŘASY

**PRŮZRAČNÁ VODA
- POŽITEK Z KOUPÁNÍ**

1 kg

SK / MASTERSIL® CHLÓR TABLET

Charakteristika: MASTERSil® Chlor Tablet sú 200 g pomaly rozpustné tablety určené k priebežnej starostlivosti o vodu v bazéne po celú sezónu. Postupné uvoľňovanie chlóru zabraňuje tvorbe baktérií a rias. Vďaka pomalému rozpúšťaniu tablet nie je nutná každodenná starostlivosť. **Návod na použitie:** Po prvom napušení bazéna vykonajte počiatkové ošetrovanie bazénovej vody prípravkami MASTERSil® Chlor START alebo ŠOK, stabilizujte hodnotu pH v rozmedzí 7,0 – 7,4 pomocou prípravkov MASTERSil® pH plus alebo minus. Potom je možné prejsť na pravidelnú údržbu vody pomocou tablet. **Dávkovanie:** Pri teplote vody nepresahujúcej +25°C dávkujte 1 – 2 tablety na 25 m³ vody každých 5 – 7 dní. V prípade vyššej teploty bazénovej vody odporúčame zvýšiť dávkovanie (tablety sa budú rýchlejšie rozpúšťať) podľa potreby. Pre dosiahnutie hygienicky nezávadné a priehľadné čistej vody je nutné udržiavať obsah aktívneho chlóru v rozmedzí 0,3 – 0,5 mg/l a hodnotu pH v rozmedzí 7,0 – 7,4. Priebežne tieto hodnoty kontrolujte, najmä po dlhšej odstavke bazéna. V prípade, že hodnota chlóru je vyššia ako 0,5 mg/l, bazén nepoužívajte a vyčkajte samovoľného zníženia obsahu chlóru. Tablety vložte do plováku alebo do skimmera pri zapnutom filtračnom zariadení, nikdy nevyhadzujte samostatne tablety do bazéna. **Vhodné pre neprofesionálne použitie.** Dodávateľ neručí za škody spôsobené nesprávnym nakladaním s prípravkom. Nevypúšťajte vodu ošetrovanú týmto prípravkom do prírodných vodných zdrojov a tokov, vypúšťanie do kanalizácie konzultujte s jej správcou. **Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.** **Skladovanie:** Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch, v suchu a chlade, v dobre vetraných miestach, mimo zdroja tepla a otvoreného ohňa, oddelene od horľavých látok a kyselín, oxidačných materiálov, oddelene od potravín, nápojov a krmív. V letnom období neskladujte liek po dlhšiu dobu na nevetranom mieste. Neskladujte pri teplote nad 25°C. Skladovanie pri vyššej teplote môže viesť k rýchlemu rozkladu, vývinu chlórového plynu a tepla dostačujúceho k zapáleniu horľavých materiálov. **Výrobok typu:** PT2. **Obsah účinnej látky:** Kyselina trichlórizokyanurová (Symklozén) CAS 87-90-1 900 g/kg. **Registračné číslo:** bio/674/D/04/3/CCHL. **Používajte biocidy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. Údaje pre dekontamináciu:** V prípade rozsypania tablety zmette, zabráňte prašnosti, prípadne dôkladne odsajte a umiestnite do vhodnej nádoby na odpad. Po spotrebovaní prípravku obal opakovaně nepoužívajte. **Prvá pomoc:** Pri vdýchnutí: Okamžite prerušte expozíciu, dopravte postihnutého na čerstvý vzduch. Pri styku s pokožkou: Umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vody. Pri zasiahnutí očí: Ihned vyplachujte prúdom tečúcej vody, rozvorte očné viečka, ak má postihnutý kontaktné šošovky, okamžite ich vyberte. Pri požití: Nevypúšťajte zvracanie, vypláchnite ústa vodou. Zaisťte lekárske ošetrovanie. **Výstražné upozornenia:** H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo. H302 Škodlivý pri požití. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. **Nebezpečná látka:** Kyselina trichlórizokyanurová. **Bezpečnostné upozornenia:** P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P261 Zabráňte vdechovaniu prachu. P270 Pri používaní výrobku nejzte, nepite ani nefajčte. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade so zákonom o odpadoch. EUH 206 Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlor).



Distribuce v ČR: DONAUCHEM s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
tel.: +420 317 070 220, fax +420 317 070 230
email: donauchem@donauchem.cz, www.donauchem.cz

Distribúcia v SR: DONAUCHEM spol. s r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava
tel.: +421 249 206 510, fax +421 249 206 500
email: donauchem@donauchem.sk, www.donauchem.sk



Made in Europe